

Белокровие

Опухолевое системное заболевание кроветворной ткани.

При лейкозе происходит нарушение кроветворных органов, выражющееся в разрастании незрелых патологических клеточных элементов как в собственно кроветворных органах, так и в других органах (почках, стенках сосудов, по ходу нервов, в коже и т. п.).

Различают спонтанные лейкозы, причина которых не установлена, радиационные (лучевые) лейкозы, возникающие под воздействием ионизирующих излучений, и лейкозы, возникающие под влиянием некоторых химических веществ.

По течению заболевания различают острые и хронические лейкозы.

Почти у всех больных лейкозами обнаруживается увеличение лимфоузлов, селезенки и печени, более выраженное при хронических лейкозах и менее — при острых. Наибольших размеров лимфатические узлы достигают при лимфолейкозе, селезенка и печень — при хроническом миелолейкозе.

Принимать пергу по 0,5 ч. ложки 1-2 раза в день.

Если пергу достать трудно, можно заменить ее пыльцой, собранной с цветков бересклета, орешника, дуба, граба, каштана, кукурузы, подмаренника (кашка) и других не ядовитых и массово цветущих растений. Пыльцу отряхивают на чистую ткань, подсушивают и просеивают от мусора через тонкое сито, после чего смешивают со свежим медом в соотношении 1:4. Такой состав лучше принимать натощак по 1 ч. ложке 1-2 раза в день.

Употребляют прополис в чистом виде — от 1 до 5 г 3 раза в день после еды (кусочек прополиса долго жуют, остаток выплевывают).

Перетопить 500 г сливочного масла (лучше деревенского), добавить 150 г измельченного прополиса, перемешать до получения однородной массы и в горячем виде отфильтровать через марлю. Готовый состав остудить и хранить в холодильнике. Принимать от 1 дес. до 2 ст. ложек в день на протяжении от 10 месяцев до 1 года.

Пить настойку прополиса на спирту по 30-40 капель 3-4 раза в день со 100 г теплого молока за 1 ч. до еды.

200 г измельченного корня аира, 0,5 л сока алоэ, 0,5 кг лугового меда и 0,5 л кагора перемешать и настаивать в темном прохладном месте 2 недели. Принимать внутрь по 1 ст. ложке за 1 ч до еды 3 раза в день, запивая настоем из цветков душицы.

Поместить свежие плоды терна под гнет на 1 сутки, затем 1 кг плодов залить 0,5 л воды и еще сутки настаивать. Долить дополнительно 1 л холодной кипяченой воды, добавить 250 г меда, тщательно размешать и на малом огне довести до кипения, сразу процедить. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день за 10-30 мин до еды.

Хранить в холодильнике.

Сборы

Гречиха посевная, цветки или листья 50,0

Мордовник обыкновенный, семена 5,0

Шиповник коричный, плоды 45,0

2 ст. ложки сухой измельченной смеси залить в термосе 0,5 л крутого кипятка, настаивать 2 ч. Процедить и пить по 1/2 стакана 4 раза в день за 30-40 мин до еды.

Одновременно 2-3 раза в день принимать по 1 ч. ложке 10%-ного прополисного меда и 1/2-1 ч. ложку цветочной пыльцы.

После месячного курса лечения менять сбор трав или делать 2-недельный перерыв.

Аир болотный, корни 5%

Брусника обыкновенная, листья 5%

Вероника длиннолистная, трава 10%

Дымянка аптечная, трава 10%

Календула лекарственная, цветки 10%

Кровохлебка лекарственная, корни 10%

Можжевельник, ягоды 5%

Пастушья сумка, трава 5%

Полынь горькая, трава 5%

Сушеница болотная трава 10%

Хвощ полевой, трава 5%

Черника обыкновенная, листья 5%

Шиповник коричный, плоды 10%

Эвкалипт круглый, листья 5%

2-3 ст. ложки сухого измельченного сбора залить в термосе 0,5 л крутого кипятка, настаивать ночь, процедить и пить по 0,5 стакана 4 раза в день.

Одновременно 2-3 раза в день принимать по 0,5-1 ч. ложке 10-15%-ного прополисного меда и по 2 таблетки препарата маточного молочка "Апилак" (держать под языком до полного растворения).

Взять поровну:

Сосна обыкновенная, почки

Береза повислая, почки и молодые листья

Тополь черный пирамидальный (осокорь), почки

Зверобой продырявленный, трава

Золототысячник зонтичный, трава

Клюква болотная, трава

Земляника лесная, трава

Голубика обыкновенная, трава

Брусника обыкновенная, листья

Черника обыкновенная, листья

2 ст. ложки сухой измельченной смеси залить 0,5 л кипятка, варить на слабом огне 4—6 мин, настаивать 1 ч, процедить и пить по 0,5 стакана 4 раза в день за 20-30 мин до еды.

Одновременно 2—3 раза в день принимать по 40-50 капель 20%-ной настойки прополиса в 50 мл воды и по 0,5-1 ч. ложке цветочной пыльцы.

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. <http://www.interpres.ru/>
Интерпресссервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>