

Воспаление желчного пузыря

Воспаление желчного пузыря. Часто развивается при желчнокаменной болезни (так называемый каменный холецистит), после вирусного гепатита и других инфекционных заболеваний, при наличии хронической очаговой инфекции (например, тонзиллита) или паразитарных заболеваний (например описторхоза).

Холециститу способствуют застой и изменение состава желчи. Нередко холецистит сочетается с холангитом.

По течению холецистит может быть острым и хроническим.

Острый холецистит проявляется болями в правом подреберье, часто приступообразными (обычно возникают через 2-4 ч после употребления жирных блюд), отдающими в правую лопатку и плечо. Появляются желтушность, тяжесть под ложечкой, вздутие живота, отрыжка, тошнота, иногда рвота.

Хронический холецистит может развиваться после повторных приступов острого, особенно при наличии камней в желчных путях. При этом беспокоят тупые ноющие боли в правом подреберье, усиливающиеся после приема пищи, чувство тяжести в верхних отделах живота, тошнота, ощущение горечи во рту.

При заболеваниях печени, желчного пузыря смешать 1 стакан меда и 1 стакан сока черной редьки, принимать по 1/2 стакана 3 раза в день. При систематическом употреблении средство предупреждает образование камней в желчном пузыре, повышает уровень гемоглобина в печени, улучшает процессы тканевого обмена, благоприятно влияет на пищеварение.

Принимают по 20 г пыльцы (перги) в день за 20—30 мин до еды в течение 20 дней. В год проводят 2-3 курса лечения.

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. <http://www.interpres.ru/> Интерпресссервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>