Воспаление молочной железы

Воспаление молочной железы, причиной которого обычно является проникновение бактериальной инфекции через травмированный сосок (возникает при трещинах, чаще всего при кормлении грудью). Внезапно появляются распирающие боли в молочной железе, она набухает, в одном месте становится плотной, тугой, резко болезненной. Кожа краснеет, лоснится. Повышается температура, иногда возникает сильный озноб. Если не принять срочных мер, на месте уплотнения возникает размягчение, которое свидетельствует о том, что образовался гнойник. В этом случае необходима срочная операция.
Местно при лечении трещин сосков молочных желез применяют 5%-ную прополисную мазь.
Концентрированным отваром зеленых листьев и плодов грецкого ореха (20 г сырья на 200 мл кипятка, настаивать 20 мин) делают примочки на маститные затвердения. При этом рекомендуется дополнительно пить разбавленный настой или чай из этих листьев с медом по вкусу по нескольку стаканов в день.
На ночь на больную грудь наложить компресс из творога с медом. Для выполнения процедуры слой меда, а затем слой творога поместить на стерильную салфетку, приложить к больной груди, сверху накрыть вощеной бумагой, затем салфеткой и закрепить бинтом. Утром компресс снять, обмыть грудь прохладной водой.
Смазывать грудь 30%-ной прополисной мазью: 100 г сливочного масла (или нутряного свиного сала) размешать с 30 г натертого прополиса, положить в глиняный горшок, поставить на газовую плиту на обыкновенный кирпич, томить 3 ч, изредка помешивая, процедить и охладить.
Сахарную свеклу натереть на терке, добавить 5 частей меда (разнотравье). Поместив смесь на капустный лист, прикладывать к груди на 40 мин 2-3 раза в день.

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. http://www.interpres.ru/ Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru