Желудочные заболевания (лечение мумиё)

0,2 г мумиё на 1 кг веса больного. Пить в течение 14 дней по 3 раза в день за 30-40 мин до еды.

Необходимо соблюдать диету во время лечения и в течение 15 дней после него.
При нулевой кислотности растворить 1 г мумиё в 1 л кипяченой воды. Пить по 1 стакану 3 раза в день за 30 мин до еды. Курс лечения — 10 дней, перерыв — 5 дней. Провести 2-5 курсов.
При любой кислотности (нулевой, повышенной и пониженной) пить по 1 стакану раствора мумиё 3 раза в день за 30 мин до еды с пищевым раздражителем. Расчет потребного количества лекарства— 0,1 г на 1 кг веса человека. Пить в течение 14 дней. Необходимо соблюдать диету во время лечения и в течение 15 дней после него.
При повышенной кислотности растворить 1 г мумиё в 1 л кипяченого молока. Пить по 1 стакану 3 раза в день за 30 мин до еды.

Литература: Гребенников Е.А. Лечение медом, продуктами пчеловодства и мумиё. - Мн.: Книжный дом, 2007. http://www.interpres.ru/ Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru