Послевзяточные работы на пасеке и ревизия пчелосемей

Во время снятия магазинов надо принять меры против пчелиного воровства, которое особенно сильно развивается после окончания взятка. Не находя взятка в поле, пчелы начинают искать его на пасеке, нападая прежде всего на безматочные и слабые семьи. Для предупреждения воровства надо принять следующие меры:

1) сократить летки во всех ульях;

2) тщательно замазать все щели на ульях.

Послевзяточная ревизия проводится сразу же после снятия магазинов. Во время этой ревизии пчеловод прежде всего определяет состояние семей и их гнезд. Особое внимание обращает на обеспеченность кормовыми запасами и их качество. Обнаружив недоброкачественный мед, он заменяет его хорошим, цветочным, заготовленным в первой половине главного взятка или в конце весны. В расчет принимается только запечатанный мед, так как незапечатанный мед семьи израсходуют до зимы.

Все маломедные рамки распечатывают и ставят за диафрагмы для обсушки. Выбраковываются и все дефектные рамки — с трутневыми или вытянутыми ячейками, покоробленные и т. д.; если они с расплодом, то их переставляют на край гнезда, имея в виду удалить из него по выходе расплода. В соответствии с силой пчелосемей сокращают их гнезда и утепляют; хотя летки уже сокращены, все же проверяют, соответствуют ли они силе пчелосемьи и условиям взятка, и если надо, их вновь уменьшают.

Особенно большое внимание обращают на качество матки и наличие расплода. Плохих маток заменяют молодыми плодными, которых дают из нуклеусов. Если есть подозрение на безматочность, дают семье контрольную рамку с молодыми личинками, а через 1-2 дня проверяют, заложены ли на ней свищевые маточники. Выяснив по наличию свищевых маточников, что семья безматочная, ее исправляют за счет тех маток, которых для этой цели выводят в нуклеусах.

Формирование нуклеусов для вывода запасных маток. Пчеловоды формируют нуклеусы в начале главного взятка, или в середине его, если взяток в этой местности продолжительный. Молодые матки в таких случаях всегда успевают спариться с трутнями до конца главного взятка. Отличительной особенностью этих маток является то, что они долго и обильно червят осенью, даже без применения побуждающих подкормок, раньше начинают червить весной, и притом червят гораздо интенсивнее маток более раннего вывода; а это весьма важно для обеспечения семьи в зимовку большим количеством молодых пчел, что в свою очередь необходимо и для быстрого развития семьи в период ранней весны. И при пониженной активности яйцекладки матки, перенесенные в нуклеусы из семей, участвовавших в медосборе, всё же могут откладывать вполне достаточное количество яиц, чтобы загрузить работой по воспитанию детки всех молодых пчел нуклеусов.

Что же касается молодых, только что осеменившихся маток, то они, попав из нуклеусов в сильные семьи, развивают в них обильное червление даже независимо от того, есть ли в природе поддерживающий взяток и производит ли пчеловод побуждающую подкормку на черву.

В результате семьи быстро пополняются молодыми пчелами осеннего вывода. Это необходимо для благополучной зимовки пчел: чем больше молодой пчелы идет в зимовку, тем лучше зимуют семьи. Кроме того, в семьях, идущих в зимовку с преобладающим количеством молодой пчелы осеннего вывода, мало бывает зимнего подмора, семьи быстро развиваются ранней весной.

Чем сильнее будет семья, развившись осенью благодаря наличию в ней молодой матки, тем меньше израсходует она на зимовке меда на каждый килограмм имеющейся в ней пчелы. Это тоже имеет большое значение в жизни пчелиной семьи, так как чем меньше потребят пчелы меда на зимовке, тем более жизнеспособными будут они весной, а следовательно, более продолжительный период будут работать весной на взятке и участвовать в воспитании нового многочисленного поколения молодых пчел. Благодаря этому семья будет быстро развиваться. Весь мед, сэкономленный пчелами во время зимовки, весной, по выставке их, они израсходуют на воспитание детки, что, конечно, будет способствовать быстрому росту семьи ранней весной.

Для пчеловода важно, чтобы в зимовку пошли сильными не только основные семьи, но и нуклеусы с запасными матками. Доказано, что чем сильнее нуклеусы, тем лучше они перезимуют, тем более жизнедеятельными выйдут пчелы весной. Поэтому, если пчеловод замечает, что нуклеусы развиваются слабо, он дает им в конце августа или в первой пятидневке сентября по одной рамке зрелого расплода, взятой от основных семей. После того как эти рамки освободятся от расплода, их из нуклеусов возвращают основным семьям для засева яйцами, а вместо них из основных семей берут по одной рамке с засевом яиц и молодыми личинками и дают нуклеусам, загружая молодых пчел работой по воспитанию детки. В результате такого мероприятия основные семьи почти не пострадают: разгрузка от одной рамки с засевом яиц и молодой червой активизирует яйцекладку матки позднелетнего вывода, которая очень быстро засеет яйцами возвращенную в гнездо рамку, освободившуюся в нуклеусе от расплода.

Для нормального осеннего развития семей гнезда их должны быть основательно утеплены.

Литература: Тарасов Е.Я. Эффективное пчеловодство. Все о домашнем пчеловодстве. - Ростов н/Д.: Издательский дом "Владис", М.: Издательский дом "РИПОЛ Классик", 2007. http://www.vladisbook.ru/ Издательский дом "Владис", http://www.ripol.ru/ Издательский дом "РИПОЛ Классик"

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru