

Запасные соты

ЗАПАСНЫЕ СОТЫ — свободные на данный момент соты, не занятые ни расплодом, ни кормами. З. с. необходимо хранить в идеальной чистоте, в помещениях, где их не могут повредить плесень, грызуны и восковая моль.

Хранение сотов может быть как открытым, так и закрытым. При открытом хранении соты развешивают на специальных рейках на таком расстоянии друг от друга, чтобы они не соприкасалась. Помещение должно быть хорошо проветриваемым. Бабочки моли обычно поражают и кладут яйца между соприкасающимися сотами, открытых они избегают. При таком расположении может быть поврежден один сот, а другие останутся нетронутыми. Такое хранение требует ежемесячного осмотра сотов.

Закрытый способ используют для хранения магазинных сотов, которые выставляют в ульи на период активного медосбора, а все остальное время они хранятся на складе.

Лучше всего хранить соты в хорошо продезинфицированных шкафах, запасных ульях и корпусах ульев в сухих и прохладных помещениях. Если соты хранятся в поставленных друг на друга ульевых корпусах или магазинных надставках, то к нижнему корпусу или магазину приделывают дно, а к верхнему — крышу. Все щели между ними заклеивают бумагой или затягивают полиэтиленовой пленкой. Не забывают также наглухо закрыть все летки.

Перед установкой на хранение необходимо провести дезинсекцию сотов, чтобы избежать попадания с ними яиц восковой моли или гусениц. Соты и выбракованную сушь опудривают энтобактерином.

Выбракованные соты и восковую сушь лучше всего перетопить.

Литература: Белик Э.В. Пчеловод. Словарь - справочник. - Ростов н/Д.: Феникс; Донецк: издательский центр "Кредо", 2007. <http://www.phoenixrostov.ru/> Феникс, <http://www.kredo.com.ua/> издательский центр "Кредо"

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>