

## Слабая семья

СЛАБАЯ СЕМЬЯ — семья, занимающая осенью 5—6 рамок, весной (после выставки из зимовника) — 4—5 рамок. Содержать а пасеке такую слабую семью нецелесообразно.

С. с. в период зимовки потребляет больше корма, чем средняя, более подвержена заболеванию нозематозом и кишечным недомоганиям, не может охранять гнездо от пчел-воровок, выращивает мало расплода, быстрее изнашивается. Такая семья убыточна для пасеки.

Летом, во время главного взятка, когда сильные семьи нацелены на максимальный сбор нектара, С. с. только выращивают расплод, а не занимаются сбором корма. Эти семьи набирают силу только к концу главного взятка, когда отцветают уже основные медоносы, так и не заготовив себе на зиму кормов. Их подкармливают сахарным сиропом или медом, собранным сильными семьями. Поэтому при наличии на пасеке С. с. необходимо с весны выровнять их, сделать средними, а затем и сильными.

Если после выставки пчел из зимовника была обнаружена С. с, то при отсутствии каких-либо заболеваний и наличии качественной матки, исправить ее несложно. Прежде всего, улей С. с. размещают в безветренном и доступном солнечным лучам месте. После облета пчел сокращают гнездо и проверяют качество корма. Если он засахарился, закис или на сотах имеются следы поноса, семьям дают другие медоперговые соты или сахарный сироп. В этот период семью обязательно подкармливают пергой. Утепляют гнездо и прикрывают летки до 8—9 мм.

Буквально через неделю после выставки пчел С. с. объединяют в одну. Их пересаживают в один улей с глухой перегородкой. Семьи лучше обогревают гнездо, а это способствует их развитию.

Каждая семья должна иметь свой леток или же пользоваться одним верхним летком. Летки сокращают и в течение 1—1,5 месяца закрывают на ночь полностью, пока в природе не установится теплая погода.

Если в гнезда дать достаточно корма и воды, у пчел отпадет необходимость вылетать в холодную погоду на их поиски. Семья будет заниматься выращиванием расплода. Первое расширение гнезд проводят, как только расплодом заполнятся центральные соты и уже матка начнет червить на крайней рамке.

С наступлением устойчивого тепла новые соты ставят с краю гнезда возле глухой перегородки; пчелы и матка охотно осваивают их. Как только семьям станет тесно в одном улье, их расселяют в разные ульи.

Весной С. с. можно усилить за счет семей, в которых имеется не менее 7 рамок с качественным расплодом. У таких семей отбирают по одной рамке расплода. Можно отобрать у ослабевших, но здоровых семей 2—3 рамки с малым количеством расплода и дать им взамен 1—2 полные рамки со зрелым расплодом. Через 1—2 дня из того расплода выйдут молодые пчелы, и этот прием можно вновь повторить. Использование этого приема приводит к быстрому укреплению семьи.

Литература: Белик Э.В. Пчеловод. Словарь - справочник. - Ростов н/Д.: Феникс; Донецк: издательский центр "Кредо", 2007. <http://www.phoenixrostov.ru/> Феникс, <http://www.kredo.com.ua/> издательский центр "Кредо"

© Гришин Михаил, 2014 г., [mail@grishinmv.ru](mailto:mail@grishinmv.ru), <http://www.medoviy.ru>