

Диабет несахарный (несахарное мочеизнурение)

Эндокринное заболевание, связанное с пониженным содержанием в крови гормона вазопрессина и характеризующееся постоянной усиленной жаждой и чрезмерно повышенным отделением почти бесцветной мочи.

Больные несахарным диабетом выделяют за сутки от 4 до 12 л прозрачной мочи с очень низким удельным весом, без запаха, не содержащей патологических компонентов, в том числе сахара (в отличие от больных сахарным диабетом). Причина — нарушение функций участков мозга, регулирующих водный обмен в организме; может быть следствием перенесенных воспалительных и инфекционных заболеваний, травмы головы, опухоли мозга.

Из-за обезвоживания организма у больных отмечаются сухость кожи и слизистых оболочек, резкое исхудание, общая слабость, подавленное настроение, головокружение и головные боли, тошнота, а иногда и рвота.

При несахарном диабете используют чистый прополис: по 3-5 г 3-5 раз в день до еды (продолжительно жевать и затем проглотить).

3-5 раз в день за 1 ч до еды принимать по 30-40 капель на 0,5 стакана теплого молока или кипятка 30%-ной настойки прополиса на 40-70%-ном спирте.

Маточное молочко, по 20-30 мг (на кончике столового ножа), кладут под язык и держат до полного растворения 3-5 раз в день за 1-1,5 ч до еды.

При несахарном диабете и спазмах сосудов головного мозга, его опухолях, общей слабости принимать смесь маточного молочка с медом: 10 г молочка смешивают на водяной бане со 100 г меда, кладут по 1/4 ч. ложки смеси под язык и держат до полного растворения или смешивают ее с 0,5 стакана теплого молока и выпивают 3-5 раз в день за 1—1,5 ч до еды.

Смешать 1 часть молочка и 20 частей 96%-ного спирта, принимать по 5-10 капель на 0,5 стакана теплого молока, чая или кипятка 3-5 раз в день до еды.

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. <http://www.interpres.ru/> Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>