

## **Инфаркт миокарда**

Инфаркт — это отмирание части или всего органа, которое возникает в результате внезапного нарушения артериального кровотока из-за эмболии (перекрытие кровотока закупоривающей массой) или наличия в нем кровяного сгустка.

Причиной инфаркта миокарда, поражающего сердечную мышцу, чаще всего является коронарный тромбоз (образование тромба в коронарной артерии, в результате чего прекращается поступление крови к определенному участку сердца).

Сбор трав при предынфарктном состоянии

Боярышник, цветки 10,0

Омела белая, листья 10,0

Пустырник пятилопастный, трава 10,0

Сушеница болотная, трава 10,0

3 ст. ложки сырья настаивают 2 ч в 0,5 л кипятка и пьют теплым с медом по вкусу по 0,5 стакана 3—4 раза в день до еды.

При микроинфаркте взять 0,5 кг хорошо закристаллизовавшегося меда, добавить 2 г маточного молочка, хорошо размешать деревянной палочкой (приготовленной заранее из березы, длиной 12-15 см и толщиной 1,5-2 см). Принимать смесь 2 раза в день (утром и вечером) за 10-15 мин до еды путем рассасывания комочка величиной с фасолину за прием. Набирая порцию приготовленной палочкой, каждый раз смесь надо перемешивать. Количество смеси рассчитано на 40 дней приема (2 цикла по 20 дней). Применять 1 раз в год, желательно в одно и то же время года. Средство безвредно.

При инфаркте миокарда принимать по 0,5-1 стакану морковного сока с 1 ст. ложкой меда до или после еды 2-3 раза в день.

Маточное молочко после инфаркта, при стенокардии и других сердечных заболеваниях, анемии, гипотонии и заболеваниях, истощающих организм:

- свежее маточное молочко принимать по 20-30 мг 3-5 раз в день за 1 ч до еды (положить под язык и держать до полного растворения);

- 10 г молочка смешать на водяной бане со 100 г меда, положить под язык 1/4 ч. ложки смеси и держать до полного растворения 3-5 раза в день за 1 ч до еды или 1 ч. ложку смеси смешать с 0,5 стакана теплого молока, чая или кипятка и пить 3-5 раз в день за 1 ч до еды;

- 1 часть маточного молочка смешать с 20 частями 40%-ного спирта (водки) и принимать по 10-15 капель в 1 ст. ложке теплой кипяченой воды 3—5 раз в день до еды.

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. <http://www.interpres.ru/> Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., [mail@grishinmv.ru](mailto:mail@grishinmv.ru), <http://www.medoviy.ru>