Истерия

Болезнь, относящаяся к группе неврозов и характеризующаяся многообразными нарушениями психики, двигательной сферы, чувствительности, функций внутренних органов. Развивается у лиц с особым складом нервной системы, но при определенных обстоятельствах возникает и у здоровых людей. В легкой степени истерия выражается раздражительностью, приступами беспричинного смеха или плача, чувством сжатия горла, затрудненным дыханием, сердцебиением и т.п. В более резкой форме проявляется истерическим характером, истерическими припадками, истерическими нарушениями сознания, функций внутренних органов, припадками общих судорог (их надо отличать от эпилептических) или параличами в разных частях тела.
Утром и вечером по 30 г меда держать во рту до полного растворения, а после обеденного приема пищи — по 40-60 г.
1 ст. ложку меда растворить в 1 стакане кипяченой остывшей до комнатной температуры воды, употреблять перед сном.
Принимать смесь маточного молочка с медом (в соотношении 4:100) по 0,5 ч. ложки 2-3 раза в день (держать во рту до полного растворения). Можно использовать препарат "Апилак": принимать по 1-2 таблетки 3 раза в день (класть под язык и держать до полного растворения). Курс лечения — 3-4 недели. После 2-3-недельного перерыва можно повторить.
При расстройствах нервной системы, истерии, судорогах 1 ст. ложку травы руты душистой (пахучей) настаивают 8 ч в 1 стакане кипятка и принимают настой теплым с медом по 2-3 ст. ложки 3-5 раз в день до еды.

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. http://www.interpres.ru/ Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru