

Миома

Доброкачественная опухоль из мышечной ткани. Миома, развивающаяся из гладких мышц (матки, желудка, кишечника, кожи), называется лейкомиомой. Обычно миома наряду с мышечными волокнами поражает и соединительную ткань, и опухоль приобретает вид фибромиомы.

Наиболее часто наблюдаются миомы (фибромиомы) матки. Опухоли чаще множественные, представляющие собой отдельные узлы различной величины и формы. Встречаются опухоли весом в несколько килограммов. В зависимости от преобладания мышечной или соединительной ткани различают миому, фибромиому и фиброму матки.

Фибромиома матки развивается вследствие гормональных нарушений, связанных с функцией яичников. Наиболее часто образуется у женщин после 30 лет.

Миома может вызывать длительные кровотечения с последующей анемией, сдавливание мочевого пузыря, кровеносных сосудов и нервов малого таза. Рост опухоли продолжается до прекращения менструальной функции, что происходит обычно в 50-55 лет. При выявлении опухоли женщина должна находиться под наблюдением врача и проходить осмотры 3-4 раза в год.

Быстрый рост опухоли, большие ее размеры, кровотечения, не поддающиеся консервативному лечению, являются показателями для хирургического вмешательства.

При доброкачественной опухоли матки (фиброме) смешать по 1 ч. ложке порошка плодов шиповника, сиропа из ягод бузины травянистой, меда, порошка яичной скорлупы и 1/2 ч. ложки семян конского каштана. Принимать после еды с фруктовым соком.

Травяные сборы

Брусника обыкновенная, листья 10%

Вероника лекарственная, трава 10%

Зверобой продырявленный, трава 15%

Ива белая, листья 10%

Крапива двудомная, листья 10%

Малина обыкновенная, листья 15%

Подмаренник настоящий, трава 10%

Ромашка аптечная, соцветия 10%

Тысячелистник обыкновенный, трава 10%

1 ст. ложку сухого измельченного сырья залить 1 стаканом кипятка, варить 10 мин на слабом огне, настаивать 20-30 мин, процедить и пить теплым по 0,5 стакана за 20-30 мин до еды 2 раза в день. Этим же настоем спринцеваться 2 раза в неделю перед сном.

Одновременно 2-3 раза в день принимать 20%-ную настойку прополиса по 30-40 капель в 50 мл воды.

При незапущенной опухоли курс лечения — 8 недель, при большой — до 1,5 года (с

перерывами).

Взять поровну:

Брусника обыкновенная, листья

Вероника лекарственная, трава

Зверобой продырявленный, трава

Ива белая, листья

Клевер ползучий белый, трава

Крапива двудомная, листья

Медуница лекарственная, трава

Ромашка безъязычковая, соцветия

Тысячелистник обыкновенный, трава

2 ст. ложки сухого измельченного сырья залить в термосе 0,5 л воды, настаивать 20-30 мин, процедить и пить теплым по 0,5 стакана 2-3 раза в день за 30 мин до еды. Через месяц лечения сделать перерыв на 10-15 дней.

Одновременно использовать свечи с маточным молочком "Апилак" (вводить по 1 свече глубоко в задний проход). Дополнительно ежедневно можно вводить во влагалище марлевые тампоны, пропитанные отваром травы чистотела большого.

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. <http://www.interpres.ru/>
Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>