

Перхоть

Заболевание кожи, характеризующееся нарушением секреторной функции сальных желез. Наблюдается у лиц обоего пола, обычно в период полового созревания (12-18 лет). Термин "себорея" переводится как "салотечение". Деятельность сальных желез меняется в сторону как гиперфункции, так и гипофункции, поэтому рассматриваются два вида себореи — сухая (перхоть) и жирная (с избыточным салоотделением).

Несомненна связь заболевания с нервно-эндокринными расстройствами. Поражается кожа головы, лица, груди и спины, где расположено большое количество сальных желез.

При себорее кожи лица непосредственно на кожу или под повязку 1 раз в сутки наносят 3%-ную мазь апилака в количестве 2-10 г.

При жирной себорее измельченную кору дуба залить кипяченой водой в соотношении 1:5, кипятить 15-20 мин, настаивать 30-40 мин, процедить, добавить пчелиный мед (1 ст. ложка на 1 стакан отвара), размешать и использовать для протирания кожи лица или втирания в корни волос.

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. <http://www.interpres.ru/> Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>