

Сердечная недостаточность

Комплекс расстройств, обусловленных главным образом понижением сократительной способности сердечной мышцы.

Возникает при перегрузке и переутомлении сердца (вследствие артериальной гипертонии, пороков сердца и др.), нарушении его кровоснабжения (инфаркт миокарда), миокардитах, токсических влияниях (например, при базедовой болезни) и т.д.

При хронической сердечной недостаточности в 1 л меда выжать 10 лимонов (или пропустить через мясорубку), почистить 10 головок чеснока и смолоть в мясорубке. Все смешать и настаивать в течение одной недели в закрытой посуде.

Принимать по 2 ч. ложки 1 раз в день, медленно рассасывая. Дни не пропускать. Лекарства хватит на 3 недели.

При хронической сердечной недостаточности, сопровождающейся тахикардией, стенокардией, отеками, 2 ст. ложки травы астрагала пушистоцветкового настаивают 2 ч в 1 стакане кипятка и принимают с медом по 2-3 ст. ложки 3-5 раз в день до еды.

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. <http://www.interpres.ru/> Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>