

Склероз

Уплотнение сосудов, вызванное гибелью функциональных элементов; отвердение стенок сосудов. Происходит отложение солей извести в сосудистых стенках и хрящах, вследствие чего хрящи теряют гибкость, а сосуды — эластичность. Известь может отложиться и в других частях тела, но для жизни опасно заболевание, главным образом, центральных сосудов: мозга, сердца, арты, почек.

Склероз может быть очаговым и диффузным.

Причинами склероза могут являться воспаления, обычно хронические (туберкулез, ревматизм, сифилис и др.), расстройства кровообращения (венозный застой), возрастные изменения, нарушения обмена и др.

При склерозе мозговых сосудов регулярно (в течение 2 месяцев) употреблять медово-луковую смесь (1:1) по 1 ст. ложке утром и вечером.

Смесь сока репчатого лука с медом (1:1) принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за 1 ч до еды или через 2-3 ч после еды.

Для расширения сосудов используют смесь сока свеклы обыкновенной с медом (1:1) или смесь сока свеклы с соком клюквы (2:1). Принимать по 1/4 стакана 3 раза в день.

Литература: Гребенников Е.А. Все о мёде. - Мн.: Книжный дом, 2005. <http://www.interpres.ru/> Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>