Тромбоз и тромбофлебит

Тромбоз — это образование сгустков крови в просвете сосудов или в полостях сердца. Развитию тромбоза способствует поражение сосудистой стенки (атеросклеротического, воспалительного и другого происхождения), замедление кровотока, повышение свертываемости и вязкости крови. У больных тромбозом обычно низкое давление.

Чаще встречается тромбоз периферических вен (см. Тромбофлебит), реже — тромбоз в артериальной системе, который обусловливает нарушение кровоснабжения соответствующего участка ткани, нередко с последующим ее некрозом. Так, тромбоз в системе коронарного кровообращения ведет к инфаркту миокарда, тромбоз сосудов мозга — к инсульту.

В дальнейшем возможно как растворение тромба, так и его уплотнение.

Тромбофлебит — это закупорка вен сгустком крови (тромбом) с развитием воспаления стенки сосуда. Причины тромбофлебита: инфекция, травма вены, замедление тока крови и повышение ее свертываемости. Иногда тромбофлебит возникает как осложнение после родов, различных операций, инфекционных заболеваний, злокачественных образований, в результате перехода на стенку вены воспалительного процесса из раны.

К развитию тромбофлебита склонны беременные женщины (из-залроисходящих у них в крови физиологических изменений и повышения внутрибрюшного давления).

Особенно часто поражаются вены нижних конечностей и малого таза.

Начальные признаки тромбофлебита нижних конечностей — ломящие и тянущие боли в икроножных мышцах, болезненность при сдавливании этих мышц руками, отеки.

Наиболее опасное осложнение тромбофлебита — отрыв тромба (или его части) и попадание в легочную артерию.
При расширении вен на ногах, тромбофлебите делать медовые компрессы (на холст нанести слой меда, приложить к больному месту, прикрыть сверху компрессной бумагой без ваты и прибинтовать) сперва на 2 ч, затем — на всю ночь.

На второй и третий день — на 4 ч и также на всю ночь. Курс лечения — 45-50 компрессов.
Принимать аптечную настойку каштана конского (эскузан) — по 10-20 капель 3 раза в день за 20 мин до еды.

Настойку легко приготовить в домашних условиях: 10 г цветков или плодов каштана конского (вынутых из колючих околоплодников) раздробить, залить 100 мл спирта (или качественной водки) и выдержать 7-10 дней в темном месте, периодически встряхивая. Процедить и принимать по 30 капель 3 раза в день за 20-30 мин до еды.

Наружно для заживления варикозных язв применять 15%-ную прополисную мазь.
1 ст. ложку коры молодых ветвей, цветков и плодов каштана обыкновенного (конского) настаивают 2-3 часа в 0,5 л кипятка и пьют теплым с медом по 0,5 стакана 3-5 раз в день до еды.
Травяной сбор трав

Солодка голая, корни 20,0

Череда трехраздельная, трава 20,0

Зверобой продырявленный, трава 20,0

Кориандр посевной, плоды 15,0

Подорожник большой, листья 15,0

Сушеница болотная, трава 10,0

2-3 ст. ложки сухого измельченного сырья залить в термосе 0,5 л крутого кипятка, настаивать 2-3 ч, процедить и пить теплым 3 раза в день после еды по 1/3 стакана, добавляя по вкусу мед, при варикозных язвах на почве тромбофлебита.

Наружно для заживления язв применять 15%-ную прополисную мазь.

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. http://www.interpres.ru/ Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru