

Эрозия шейки матки

Дефект эпителия, покрывающего влагалищную часть шейки матки.

Влагалище предварительно очистить от секрета, затем ввести марлевый тампон, смоченный раствором меда с водой (в соотношении 1:2), на 24 ч.

Процедуры проводить ежедневно в течение 15-20 дней. Самочувствие обычно улучшается, выделения прекращаются после 5-6 процедур, а через 12-15 исчезают болезненные ощущения, нормализуется состав секрета и наблюдается полное заживление эрозии.

3%-ным спиртовым раствором прополиса смочить тампон и ввести во влагалище, прижав его к шейке матки (секрет предварительно удалить). Через 8-12 ч тампон вынуть.

Курс лечения при бактериальных, грибковых и трихомонад-ных воспалениях влагалища, а также при эрозиях шейки матки в среднем 7-10 дней (тампоны вводят 1 раз в день).

При использовании 10%-ной спиртовой настойки прополиса i предварительно разводят водой.

15 мл 20%-ной настойки прополиса и 15 мл настойки кален. улы смешивают с 60 г ланолина, чтобы получилась гомогенная мазь. При лечении эрозии шейки матки сначала удаляют секрет, затем во влагалище вводят тампон с мазью. Удаляют его через 10-12 ч за привязанную к нему нитку.

Вводят тампон 1 раз в сутки. Курс лечения — 14-18 дней.

Используют прополисную мазь (см. Кольпит).

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. <http://www.interpres.ru/>
Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>