**Чахотка**

Инфекционное заболевание с образованием специфических воспалительных изменений, часто имеющих вид мелких бугорков, преимущественно в легких и лимфатических узлах, и с наклонностью к хроническому течению.

Основной источник распространения туберкулеза — больной человек. Передача инфекции —> воздушно-капельным путем.

Развитию заболевания способствуют: ослабление организма в связи с нехваткой в пище полноценных животных белков и витаминов (витамина С); неблагоприятные условия труда и профессиональные вредности; некоторые заболевания (сахарный диабет, хронический бронхит, алкоголизм и др.); возрастные особенности организма (дети и люди пожилого возраста в большей мере подвержены заболеванию).
Туберкулезное поражение кожи:

- При заболевании кожи пораженный участок смазать натуральным медом или же делать компрессы и местные ванны из 3%-ного раствора меда. Процедуры проводить 1-2 раза в день, после чего желательно 2 ч отдохнуть.

- 500 г сливочного (несоленого) масла в эмалированной посуде доводят до кипения, снимают с огня и кладут в него 50 г очищенного и измельченного через мелкую терку прополиса. Путем перемешивания смесь экстрагируют (создают однородную массу) в течение 30 мин при температуре 80°С, доводят до полного остывания и смазывают пораженные участки кожи.

- 25—50 г очищенного и измельченного прополиса настаивают 7-10 дней в 0,5 л 90%-ного спирта и используют наружно для орошений и примочек.
При туберкулезе горла: зубчик измельченного чеснока смешивают с медом (1:1) на водяной бане и многократно (без ограничения) продолжительно держат во рту по 0,5 ч. ложки (как бы смазывая полость рта и горло).
Туберкулез легких:

- Для очищения легких от мокроты полезно питаться медом с ядрами лесных орехов, которые особенно помогают при длительном кашле.

- При туберкулезе легких рекомендуют прием смеси овощных соков (репы, моркови) с медом. Можно употреблять мед с хреном — одну горсть тертого хрена смешивают с 1 кг меда. Смесь настаивают 7-8 дней в темном месте, затем принимают по 2 ст. ложки в день перед едой. Это средство является общеукрепляющим, повышающим иммунобиологические защитные силы организма.

- К 100 г масла коровьего, помещенного в эмалированную посуду и нагретого до 50-60°С, добавить 10 г измельченного прополиса. Полученную смесь нагреть до 70°С и выдержать (при данной температуре) в течение 8-10 мин при непрерывном помешивании, профильтровать через один слой марли.

После охлаждения отфильтрованную массу смеси принимать по 1 ч. ложке 2-3 раза в день за 1—1,5 ч до еды с теплым молоком в течение 2 месяцев.

После 2-3 недельного перерыва курс лечения (при необходимости) повторяется с увеличением нормы прополиса каждый последующий раз на 5 г, доводя ее до 30 г.

- Принимать смесь меда, порошка какао, топленого сала и сливочного масла (см. Анемия).

- 100 г меда, 100 г сливочного масла, 100 г гусиного жира (или смальца), 100 г какао, 15 мл сока алоэ смешивают и нагревают до начала кипения. Принимают по 1 ст. ложке смеси, растворенной в 1 стакане горячего чая, 2 раза в день (утром и вечером).

- Приготавливают смесь из 150 мл сока алоэ, 250 г меда, 350 мл вина (кагор) и настаивают в темном месте в течение 6—7 дней. Принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 мин до еды.

- Положить в банку 6 свежих яиц с белой скорлупой, выжать туда сок 10 лимонов и поставить в сухое прохладное и темное место, накрыв темной бумагой и обернув марлей. Через 7-16 дней (после растворения скорлупы) влить в раствор 300 г меда (предварительно, подогревая, довести до полужидкого состояния и остудить). Все перемешать. Принимать по 1 дес. ложке 3 раза в день сразу после еды. Хранить в прохладном месте.

- Собранные во время цветения кукурузные рыльца в виде порошка смешать с медом в соотношении 1:2 и принимать по 1 ч. ложке 3-5 раз в день до еды.

- 2-3 ст. ложки цветущего растения лесной земляники (все части растения с корневищем) кипятят 10-15 мин в 1 л кипятка, настаивают 1 ч и пьют теплым с медом по 1 стакану 3—5 раз, до еды.

- 1 ст. ложку коры ивы настаивают 2 ч в 1 стакане кипятка и принимают настой по 1-2 ст. ложки теплым с медом за 2 ч до еды.

- Свежеприготовленный сок из листьев агавы американской смешивают на водяной бане с медом 1:1 и принимают по 1 ст. ложке 3-5 раз в день до еды.

- 2 ст. ложки сухих измельченных листьев фиалки душистой залить в фарфоровом чайнике 1 стаканом кипящей воды, настаивать 12-15 мин и пить в теплом виде с медом (растворять его по вкусу) по 0,5 стакана 3 раза в день.

При сильном кашле пить чай по 50 мл через каждые 3 ч.

- Травяной сбор

Солодка голая, корни 20,0

Мать-и-мачеха, листья 15,0

Медуница лекарственная, трава 15,0

Хвощ полевой, трава 25,0

Ясменник душистый, трава 20,0

3 ст. ложки сухого измельченного сбора залить 0,5 л кипятка,

настаивать в термосе 1,5-2 ч. Процедить, пить глотками в течение

дня.

Одновременно принимать 15%-ное прополисное масло (по 1 ч. ложке 2-3 раза в день).
Туберкулез костей и суставов:

- Залить 2 стаканами кипяченого молока (или воды) 1 ст. ложку мужских соцветий сосны (почек), добавить 2 ст. ложки меда, 2 ст. ложки сливочного масла, 2 сырых яйца, перемешать.

Разделить на 3 приема и выпить в течение дня.

Мужские соцветия (тычиночные колоски) появляются на сосне в конце мая, они сидят кубышечками на коротких ножках и светятся позолотой. Женские соцветия — красноватые пестичные шишечки.

- Смешать по 1 стакану сока черной редьки, красной свеклы, моркови и меда, слить все в бутылку и зарыть в землю на 12 дней. После настаивания пить по 2 ст. ложки 3 раза в день перед едой (перед употреблением взбалтывать).

- Смешать 1 стакан спирта, 1 стакан меда и 1 ст. ложку березовых почек, настаивать 9 дней и пить по 1 ст. ложке 3 раза в день.

- Смешать 1,2 кг липового меда, 1 стакан мелко нарезанных листьев алоэ, 100 г оливкового масла, 150 г березовых почек, 50 г липового цвета и 2 стакана воды. Растопить в кастрюле мед, добавить к нему алоэ и хорошо проварить. Отдельно в разной посуде заварить березовые почки и липовый цвет, отжать, влить отвары в мед. Смесь разлить в 2 бутылки, добавив в каждую поровну оливковое масло. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день, взбалтывая перед употреблением.

- Взять по 250 г меда, сливочного масла, гусиного жира, изюма, желтого сахара и 6 г "серного цвета" (сублимированной серы) и сложить в глиняный горшок емкостью 3 л. Растопить смесь, размешивая деревянной ложкой. Снять с огня, продолжая размешивать до остывания. Принимать за 1 час до еды. Первоначальная доза — на кончике ложки; в течение 7 дней увеличить ее до 1 кофейной ложки. Затем так же постепенно уменьшать дозу, доведя ее до исходной. Провести 7-8 курсов лечения.

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. http://www.interpres.ru/ Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru