Чирей

Острое гнойно-некротическое воспаление волосяного мешка и окружающей соединительной ткани, вызываемое гноеродными бактериями, главным образом золотистым стафилококком.

Возникновению фурункула способствуют загрязнение и микротравмы кожи, повышенное пото- и жироотделение, нарушение обмена веществ и т.п.

При локализации фурункулов на лице возможны тяжелые осложнения (гнойный менингит, сепсис).
Лечение можно проводить путем смазывания пораженного участка кожи натуральным цветочным медом или в виде компресса, местной ванны (30%-ный раствор).
Смешать пчелиный мед с ржаной мукой в равных пропорциях до консистенции мокрой глины и применять в виде лепешек — накладывать на фурункулы или карбункулы, прикрыв бумагой для компрессов и зафиксировав повязкой. Менять лепешки ежедневно.
Смесь (поровну) живицы, свиного смальца и желтого воска растопить, хорошо перемешать и охладить. Смазывать пораженные участки кожи.
Лепешку из чистого прополиса приложить к фурункулу и прикрепить лейкопластырем. Не снимать до полного размягчения фурункула и выделения гноя (2-3 дня).
1 ст. ложку меда, 2 яичных желтка, 0,5 ч. ложки поваренной соли смешать с ржаной мукой (до консистенции мокрой глины). Лепешку из теста наложить на воспаленную кожу, прикрыть сверху бумагой для компрессов и зафиксировать повязкой.

При раннем наложении медовой лепешки наблюдается рассасывание воспалительного уплотнения, при позднем она способствует прорыву гнойника, скорому очищению и заживлению гнойничков и фурункулов.

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. http://www.interpres.ru/ Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru