

Июль

В районах средней полосы повсеместно начался главный взятки. В ульях быстро накапливается мед. Пчелы, заливая ячейки нектаром, ограничивают червление маток до 300-400 яиц в сутки. Летные пчелы изнашиваются и к концу главного взятка семьи уменьшаются. Основную массу товарного меда пчелы собирают с липы, гречихи, подсолнечника, кипрея, белого клевера и лугового разнотравья. Организуя перевозку пчел с одного массива медоносов на другой, пчеловоды используют несколько взятков.

К началу главного взятка все семьи должны быть сильными и полностью занимать гнездовое отделение улья и магазин или второй корпус, а также не иметь роевого состояния. Если на пасеке есть временные семьи с матками-помощницами, их присоединяют к основным семьям и этим создают мощные семьи-медовики.

На время главного взятка важно высвободить ульевых пчел-кормилиц для работы в поле. Поэтому к данному периоду приурочивают смену маток. При главном взятке, продолжительностью 10-20 дней, замену старых маток делают перед его наступлением, вылавливая маток и раздавая семьям заранее подготовленные запечатанные маточки. При продолжительном главном взятке замену старых маток проводят в конце взятка и дают сразу молодых плодных маток, подготовленных в нуклеусах. К выкачке меда из гнезд приступают после того, как кормовые запасы достигнут нормы (18-22 кг на семью). Чтобы не нарушать работу семьи, рамки для откачки меда отбирают из ульев в конце дня.

Брать для откачки следует только рамки со зрелым медом, который пчелы уже начали печатать в верхней части сота. При сильном медосборе, если контрольный улей показывает дневную прибыль 8-10 кг и более, магазины заполняются нектаром быстрее, чем созревает мед. Такой незапечатанный мед выкачивать из рамок нельзя. Для созревания меда заполненный пчелами магазин поднимают и под него на корпус улья ставят второй магазин с пустыми сотами. Через 5-7 дней в верхнем магазине мед дозреет.

Прежде чем приступить к выкачке меда, надо подготовить рабочее место и соответствующее оборудование. Мед — пищевой продукт. Поэтому при откачке и дальнейшей обработке меда пчеловод должен строго соблюдать санитарно-гигиенические требования: тщательно мыть руки и инструменты, надевать чистый халат, устранять доступ насекомых.

В районах севера в начале июля заканчивается роение, и дальше идет главный медосбор с клевера белого и шведского, кипрея, дягиля, лугового василька, вереска и других медоносов.

В районах юга продолжается взятки с подсолнечника, шалфея мутовчатого, донника, синяка, будяка. Во многих местах дают взятки поливная люцерна, хлопчатник и др. культуры.

Литература: Тарасов Е.Я. Эффективное пчеловодство. Все о домашнем пчеловодстве. - Ростов н/Д.: Издательский дом "Владис", М.: Издательский дом "РИПОЛ Классик", 2007. <http://www.vladisbook.ru/> Издательский дом "Владис", <http://www.ripol.ru/> Издательский дом "РИПОЛ Классик"

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>