

Июнь

В районах средней полосы продолжается рост семей. Матки развивают наивысшую яйценоскость — до 1 500-2 000 яиц в сутки. В быстро растущих семьях накапливается избыток пчел-кормилиц. Если пчеловод не отбирает расплода и пчел, семьи закладывают роевые маточники и переходят в бездеятельное роевое состояние, заканчивающееся естественным роением.

Идет взятки с белого клевера, малины (садовой и лесной), крушины, жимолости, брусники и других медоносов. Начинают цвести дикая редька, василек синий, донник, кипрей. В местностях, богатых белым клевером, малиной и крушиной, уже с половины июня сильные семьи начинают заполнять магазины медом.

Основное внимание пчеловода сосредоточено на выполнении плана прироста пасеки и подготовке пчел к использованию главного взятка. Заканчивается наращивание пчел к медосбору.

В конце июня создают партию поздних нуклеусов, чтобы иметь плоднотных маток для смены старых, а также в запас на зиму (не менее 10% от общего числа семей).

На семьи, от которых не берут отводков, пораньше ставят вторые корпуса для увеличения силы семьи и предупреждения роения.

Одновременно с получением новых семей и наращиванием пчел к главному взятку пчеловод добивается отстройки новых сот.

Для складывания меда на сильные семьи ставят магазины (если заранее не были поставлены вторые корпуса). В магазины помещают часть рамок с готовыми сотами, а часть — с искусственной вощиной, так как во время медосбора пчелы усиленно выделяют воск и хорошо строят соты.

Чтобы получить много меда, надо заранее разведать место, богатое медоносами, и вывезти туда пасеку. При кочевке следует отдавать предпочтение местности, в которой обильный медосбор сочетается с опылительной работой пчел в поле, так как это повышает урожай многих сельскохозяйственных культур.

Июньский медосбор надо использовать для накопления кормовых запасов пчелам в зиму (меда и перги). Июньский взятки дает самый лучший для зимовки мед.

Пчеловод следит за тем, чтобы в ульях и на складе не развивалась восковая моль, принимает меры к просушиванию зимовника.

В районах севера идет развитие семей, пчелы имеют взятки с черемухи, брусники, крушины, горлеца, луговой герани, белого клевера и других медоносов. С зацветанием рябины в лесу наступает постоянный летний взятки. Начинается естественное роение. В районах юга наступает главный медосбор с эспарцета, кольчатого шалфея, донника, синяка, будяка, мышиного горошка, ластовня, горчица, липы, гречи и других медоносов. Пчел вывозят на кочевку, параллельно продолжают образование отводков, заготавливают кормовые запасы меда и откачивают товарный мед. Изыскивают лучшие стоянки для повторных кочевок на более поздние медоносы.

Литература: Тарасов Е.Я. Эффективное пчеловодство. Все о домашнем пчеловодстве. - Ростов н/Д.: Издательский дом "Владис", М.: Издательский дом "РИПОЛ Классик", 2007. <http://www.vladisbook.ru/> Издательский дом "Владис", <http://www.ripol.ru/> Издательский дом

"РИПОЛ Классик"

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>