

Болезни и вредители расплода. Незаразные болезни

Застуженный расплод

Это заболевание вызывается сильным переохлаждением гнезда, в результате гибнут личинки и куколки. Болезнь чаще бывает весной при возвратных холодах и осенью, когда пчелы собираются в клуб, оголяя расплод. Застывание расплода может также произойти в результате резкого ослабления семьи, например, при отравлении ядами или при тяжелой форме болезни пчел (нозематозе, ака-розе и др.).

Цвет погибшего расплода сначала серый, затем темнеет. Как правило, расплод гибнет на соте сплошными участками. В середине гнезда, где пчелы поддерживают тепло, расплод сохраняется.

Болезнь обнаруживается тогда, когда пчелы начинают прогрызать крышечки и очищать ячейки с больным расплодом. Никогда не бывает, чтобы здоровые личинки попадались среди погибших, как это имеет место во всех формах заразных заболеваний расплода.

Для предупреждения застуживания расплода гнездо нужно утеплять и своевременно его сокращать.

Все соты с погибшим расплодом удаляют и перетапливают на воск.

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. <http://www.interpres.ru/>
Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>